

De fazant



Bouw

Hoenderachtigen

- sterke en stevige lopers (poten) met sporen
- seksueel dimorfisme: verschil tussen mannelijke en vrouwelijke vogel

Pluimenkleed/Kleur

Hanen: Oorpluimen

Hen: •bodembroedster (schutkleur); geel oranje irisveld

- Kuikens: ruien na 6-7 weken, geen sporen

Gewicht

Haan : 1,750 kg Hen : 1,250 kg

Gedrag

- standvogels: blijft waar hij uitgebroed is
- behoefte aan dierlijk eiwit (kuikens)
- haan is polygaam
- hen broedt alleen op de bodem
- slapen op de grond of in bomen
- elke dominante haan heeft in het voorjaar een eigen territorium

Oud of jong

- jonge hanen hebben geen oorpluimpjes en een stomp en kort spoor
- jonge hanen en hennen bezitten een “beurs van Fabricius”, boven in de cloaca (aarsuitgang) ligt een holte

Balstijd

Rond maart – april
Hoofdpaartijd: april mei

Leg, nest :10 à 15 bruine eieren, eileg begint rond 15 april.

Broed

- broedduur: 24 dagen
- nestvlinders: kuikens verlaten nest zeer snel, zoeken dierlijk eiwit (insecten)
- de hen blijft bij de kuikens tot ze de leeftijd van tenminste 10 weken bereiken
- 2 à 5 kuikens per hen worden volwassen

Voedsel

- plantaardig en dierlijk voedsel, vn. wormen en insecten
- voedsel voor kuikens: dierlijk

Vijanden

- natuurlijke predators, zoals vossen, kraaien, eksters.
- gemechaniseerde landbouw
- verkeer
- recreatiedruk
- stropers

Ziekten

Coccidiose, snot, rodentiose, paratyphus, syngamose, darmworme