

De houtduif



Bouw: Groter dan huisduif.

Pluimenkleed

Papaverblauwe kleur op kop en hals. Een witte vlek in de nek die nooit één gesloten ronde ring vormt. Krop wijnrood dat langzaam verschuift naar vuil witgrijs (buik). Op de vleugelslag licht- tot middelgrijs gescheiden door een witte dwarsstreep. Staart donkergrijs met zeer donker eindvlak. Witte halsvlek bij volwassen duiven. Oog: oranjegeel iris.

Gedrag: Standvogel. In de winter komen houtduiven uit het noorden bij ons. De doffer is monogaam. Nestzitter. Gaat klapwiekend op.

Geslachtsverschillen: Geen merkbaar verschil.

Oud of jong

Jonge houtduiven verschillen van volwassen houtduiven in:

1. geen metaalgroene glans in de nek
2. witte halsvlekken ontbreken (zijn er pas na het ruien)
3. bek is zwart tot bruin (later geel met rozerode basis)
4. poten en klauw zijn grijs (later blauwrood)
5. de eerste handpennen zijn bruinzwart op de rand en de schouderdekveertjes hebben een lichtrossige getinte ronding.

Baltstijd: Februari tot begin september

Nest, leg en broed

1. 2 witte eieren
2. broed duurt 17 dagen
3. gemiddeld 4 legsels per jaar

Kweek en groei

Jongen worden gevoed met kropmelk. Rond de derde week nemen de jongen tot 80 % van hun normale voeding (steeds uit de krop).

1. na ongeveer 14 dagen kruipen de jongen (nestzitters) in het nest rond
2. de jongen zijn vliegvlug na 29 à 35 dagen

Voedsel: Zeer opportunistisch voedselgedrag volgens de omstandigheden en het seizoen. Planteneter.

Schade: Schade aan zaailand, cultuurgewassen. Schade voornamelijk in de maanden april – mei.

Vijanden: Kraaien, gaaien, marterachtigen en ook eekhoorn: 30 tot 60% van de jongen als gevolg van nestroof of jongenroof na nestuitval bij rukwind. Jongensterfte als gevolg van niet weidelijke bejaging van de ouderparen tot 70 %.