

Het Wild Konijn



Bouw : Kleiner en meer gedrongen dan de haas. Oren: zonder zwarte brandrand Ogen: donkerbruin irisveld

Haarkleed : Eentonig bruingrijs, grijswitte onderwol, roestbruin in de nek, grijswitte buik en onderstaart. Bovenstaart zwart en witte oogomlijning.

Gedrag : Bij toenemende populatiedichtheid neemt de agressie sterk toe en neemt de vruchtbaarheid af. Caecophagie overdag: eet zachte faeces met veel vitaminen uit de anale opening.

Rammeltijd : Van februari tot augustus met een piek in juli.

Dracht, nest en werpen :

1. moeren werpen van februari tot eind september telkens \pm 5 jongen.

2. Drachtduur \pm 30 dagen

3. aantal worpen: 3 à 5 afhankelijk van omstandigheden

4. dominante moer werpt jongen in burcht, andere moeten zelf werpgrentel graven.

Voedsel: Tarwe, koren en maïs, jonge boomstammen. Het lichaamsvocht wordt door waterrijk voedsel op peil gehouden.

Vijanden: Vos, marterachtigen, verwilderde katten, loslopende honden, kraaien, eksters, gaaien, roofvogels. Maaiverliezen, sproeibeurten met pesticiden. Verkeer en recreatiedruk. Stropers en natte seizoenen.

Ziekten

1. MYXOMATOSE: virusziekte alleen bij konijnen

2. RVHD Rabbit Viral Hemoragic Disease

Schade : Vraatschade vooral langs de dekking